

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

24 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α


A1. → α)

A2. → γ)

A3. a) → Σ



Το ιόν F^- υδρολύεται οπότε σχηματίζεται βασικό διάλυμα:



Για το NaCl δεν υδρολύεται κανένα ιόν και άρα σχηματίζει ουδέτερο διάλυμα

β) → Λ

$$\text{PH}_1 = 10 \text{ στους } 25^\circ\text{C} \rightarrow \text{POH}_1 = 4 \text{ άρα } [\text{OH}^-]_1 = 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{και } [\text{NaOH}]_1 = C_1 = 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{PH}_2 = 12 \text{ άρα } \text{POH}_2 = 2 \text{ και } [\text{OH}^-]_2 = 10^{-2} \text{ M } \text{ και } [\text{NaOH}]_2 = C_2 = 10^{-2} \text{ M}$$

κατά την ανάμειξη ίσων όγκων των δύο διαλυμάτων ισχύει:




$$C_1V + C_2V = C_T \cdot 2V \quad \text{ή} \quad C_T = \frac{C_1 + C_2}{2}$$



$$C_T = \frac{10^{-4} + 10^{-2}}{2} = \frac{101 \cdot 10^{-4}}{2} = 50,5 \cdot 10^{-4} = 5,05 \cdot 10^{-3} \text{ M που δίνει } \text{PH} = 11.$$

A4. a) A → προχοΐδα
 B → κωνική φιάλη

β) Γ → πρότυπο
 Δ → ογκομετρούμενο

A5. a) A: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$






- γ) i) Με επίδραση διαλύματος I_2/NaOH , στο δοχείο που περιέχει τη 2 - προπανόλη θα σχηματιστεί κίτρινο ίζημα.
ii) Με επίδραση διαλύματος Na_2CO_3 , στο δοχείο που περιέχει το προπανικό οξύ εκλύεται αέριο (CO_2).

ΘΕΜΑ Β

B1.



$$K_a = \frac{x^2}{0,1 - x}$$


$$\frac{K_a}{c} = \frac{10^{-5}}{0,1} = 10^{-4} < 0,01 \text{ áρα } 0,1 - x \approx 0,1$$

$$\text{Áρα } \text{pH} = -\log 10^{-3} \text{ ή } \text{pH} = 3.$$

B2. Για το Δ_5 έχουμε:

$$\text{CH}_3\text{COOH} : C_{T_1} = \frac{0,1 \cdot 500}{1000} \text{ ή } C_{T_1} = 0,05 \text{ M}$$

$$\text{HCl} : C_{T_2} = \frac{0,2 \cdot 500}{1000} \text{ ή } C_{T_2} = 0,01 \text{ M}$$



$$K_a = \frac{y(y + 0,1)}{0,05 - y}$$

σχύουν οι προσεγγίσεις
 $y + 0,1 \approx 0,1 \quad 0,05 - y \approx 0,05$

$$\Rightarrow 10^{-5} = \frac{y \cdot 0,1}{0,05} \text{ ή } y = 5 \cdot 10^{-6}$$


$$\text{άρα } \alpha = \frac{y}{c} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0,05} = 10^{-4}$$

Το pH καθορίζεται πρακτικά από τον ιοντισμό του HCl άρα

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = y + 0,1 \approx 0,1 \text{ άρα } \text{pH} = -\log 0,1 \text{ ή } \text{pH} = 1.$$

B3. $n_{\text{CH}_3\text{COONa}} = C \cdot V = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2 \text{ mol.}$

$$n_{\text{HCl}} = C' \cdot V' = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1 \text{ mol.}$$



Προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα με


$$C_{\text{CH}_3\text{COONa}} = C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{0,1}{1} = 0,1 \text{ M}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{C_\beta}{C_{\text{oξ}}} \text{ ή } \text{pH} = 5 + \log \frac{0,1}{0,1} \text{ ή } \text{pH} = 5$$

B4. $n_{\text{HCl}} = C \cdot V = 0,1 \cdot 1 = 0,1 \text{ mol.}$


$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C' \cdot V' = 0,05 \cdot 1 = 0,05 \text{ mol.}$$

$$n_{\text{NaOH}} = C'' \cdot V'' = 0,0375 \cdot 4 = 0,15 \text{ mol.}$$




Το PH του Δ_σ καθορίζεται από την υδρόλυση του CH₃COONa.

$$C_{\text{CH}_3\text{COONa}} = \frac{0,05}{5} = 0,01 \text{ M}$$



Υδρολύεται το CH₃COO⁻



$$(\text{Ισορ.}) 0,01 - \varphi \quad \varphi \quad \varphi$$

$$K_\beta = \frac{K_w}{K_a} \text{ ή } K_\beta = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}$$

$$\left. \begin{array}{l} K_\beta = \frac{\phi^2}{0,01 - \phi} \\ 0,01 - \phi \approx 0,01 \end{array} \right\} \Rightarrow 10^{-9} = \frac{\phi^2}{0,01} \Rightarrow \phi = 10^{-5,5}$$

Άρα $\text{POH} = -\log 10^{-5,5}$ ή $\text{POH} = 5,5$ και $\text{PH} = 8,5$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. α) $X = \text{Φωσφορική ομάδα}$ (Φωσφορικό οξύ)

$Y = 2$ δεόξυ D ριβόζη

$Z = \text{αζωτούχα βάση}$

Ο δεσμός $Y-X-Y$ ονομάζεται φωσφοδιεστερικός

β) Το πρώτο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει ελεύθερη **τη φωσφορική ομάδα** του 5^{o} ατόμου άνθρακα ενώ το τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3^{o} άνθρακα. Άρα η **αλληλουχία** των βάσεων στην πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει φορά πολυμερισμού $5' \rightarrow 3'$. Οπότε το A αντιστοιχεί στο $5'$ άκρο και το B στο $3'$ άκρο.

Γ2. β)

Γ3. α) Σ

β) Λ

γ) Σ

δ) Σ

Γ4. α. 2

β. 4

γ. 5

δ. 3

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. α) Μελετώντας **τη γραφική παράσταση**, ισχύει η μαθηματική εξίσωση Michaelis-Menten.

$$v = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}$$

Παρατηρούμε ότι σε κάποια στιγμή η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με το μισό της μέγιστης τιμής, δηλαδή $v = \frac{V_{\max}}{2}$, οπότε η εξίσωση Michaelis-Menten γίνεται:

$$\frac{V_{\max}}{2} = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{[S]}{K_m + [S]} \Leftrightarrow K_m + [S] = 2[S] \Leftrightarrow K_m = [S]$$

Οπότε η K_m ισούται με τη συγκέντρωση του υποστρώματος όταν η ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης είναι η μισή της μέγιστης.

Άρα $K_m = 0,1$.

$$\beta) v = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}$$

$$0,1 = \frac{0,3 \times 0,2}{K_m + 0,2} \Rightarrow 0,1 K_m + 0,02 = 0,06 \Rightarrow 0,1 K_m = 0,04 \Rightarrow \\ \Rightarrow K_m = 0,4.$$

- γ) Η K_m μας πληροφορεί για το βαθμό συγγένειας του ενζύμου υποστρώματος. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της K_m , τόσο μεγαλύτερη η συγγένεια ενζύμου-υποστρώματος. Άρα, εφόσον η K_m_2 είναι μεγαλύτερη από την K_m_1 ($K_m_2 > K_m_1$), το ένζυμο E_2 έχει μικρότερη συγγένεια από αυτήν του E_1 .

Δ2. α)

Met- Ser

Met- Ser- Cys

Cys- His- Lys

His- Lys- Ala- Ala

Ala- Ala - Phe

Phe- Pro- Tyr

Pro- Tyr

β) Met- Ser- Cys- His- Lys- Ala- Ala- Phe- Pro- Tyr

Δ3. α)

Ala- Gly – Val

Ala- Val- Gly

Val- Gly – Ala

Val- Ala- Gly

Gly – Ala- Val

Gly – Val- Ala

β) Σχηματίζεται τριπεπτίδιο. Άρα στο μόριο περιέχονται 2 πεπτιδικοί δεσμοί (Σχολικό βιβλίο σελίδα 39).

γ) Η υδρόλυση μπορεί να γίνει:

α) με χημική υδρόλυση

β) με ενζυμική υδρόλυση

(Σχολικό βιβλίο σελίδα 30)